

Cukorszőlő

Vass7R13s481-485



Collection Vassal-Montpellier

OMtp287

Cukorszőlő

1-20 S6

1.20 S6
Cukorszőlő
Vass7R13s481-485







DESIGNATION *Cukorszőlő*
CLOS 1 PLANCHE 20 RANG § souche 6

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 7-8-73

Date de Maturité : 3-9-73 $\times + 3$

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 1

s3 2 avec pépins - apyrène

s4 0 JUS : inc. - coloré

s5 3

DESIGNATION : *Cukorszőlő*

CLOS 1 PLANCHE 20 RANG § Souche 6

Vigueur : 3

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 1

Date de Véraison : 2-8-74 $\times + 2$

Date de Maturation : 28-8-74 $\times + 2$

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

dis. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 6

s3 12 avec pépins - apyrène

s4 9

s5 7 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : *Cukorszőlő*
CLOS 1 PLANCHE 20 RANG § Souche 6

Vigueur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 5

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 26-8-75 $\times + 2$

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 3

s3 5 avec pépins - apyrène

s4 5

s5 6 JUS : inc. - coloré

Année : 1973

Emplacement 1. 20. 5. 6 Désignation / Cukorzölő

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		27.3	30.3		
1 8					
2 3	2	2	x		
3 3	1	1			
4 2 0	1	2	x	De 29.3.73 x	
5 3 2	1	2	x		

Année : 1974

Emplacement 1. 20. 5. 6 Désignation / Cukorzölő

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		20.3	27.3		
1 8					
2 5	0	3	x		
3 5	1	3	x		
4 5	1	3	x	De 26.3.74 x	
5 6	0	3	x		

+6

Année : 1975

Cukorszőlő
1. 20 S6

Emplacement Désignation /

	Nombre Total d'yeux	D A T E S				
		6.3	10.3	13.3	17.3	21.3
1	3	1	2	2	2 -	2
2	5	0	0	1	2	2
3	3	0	0	0	1	1
4	5	1	1	2	2	3 +
5	5	0	1	2	2	2 -

+8

06.21-3.751

Cukorszőlő

ni

Véraisons à 50 % 80 81 82
1 - 20 - 86 7-8 +1 23-7 -15 13-7 0

-0,2

Fertilité taille courte 83 84 86
1 - 20 S6 17 18 14

16

ni
DESIGNATION : Cukorszőlő ♀
EMPLACEMENT : 1.2056-
Date de la vendange : 14.9.88 +H
Poids de la vendange : 6,100.
Nombre de souches : 2 3Kg050
Nombre de grappes : 25 244g
Pourriture : 0
Couleur : Bl.
Indice réfract. : 17,8 909
Acidité du moût : 3,0g
Date :
Pressurage
Densité :
Date : 23.9
Mise en bouteille 2810
Densité : 994
Degré alcoolique : 10°4
Acidité du vin : 4,5

DATE DE DÉGUSTATION : 27 JAN. 1989
OBSERVATIONS : Note 2,58

ni
Cukorszőlő.
1.20-56 Nbre d'yeux Nbre de grappes Fertilité Nbre Floraison
1992 34 48 14 26.5 (+4)

ANNEE: 1994

NOM Cukorszőlő
ni.

EMPLACEMENT 12056

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	10			8	g	26.5	28.5	30.5				
2	8			6			+5					
3	6			5								
4	8			10								
5	6			4								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : Vigueur :

ANNEE: 1995

NOM Cukorszőlő
ni

EMPLACEMENT 12056

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	10			0	4	27.5	30.5	3.6				
2	10			2			+2					
3	6			2								
4	10			9								
5	8			3								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : 1/2 Vigueur : 4,5

HOM

EMPLACEMENT. 1 20 56

couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lié	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6	11.3	18.3*	11	15	28.5	31.5	3-6	33.7	26.7	29.7	2.9
2	6	28.2	4.3*	8			+1		-2			+3
3	4	11.3	18.3*	8	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Fort</u> : <u>Vigueur</u> :							
4	6	11.3	18.3*	5								
5	6	4.3	11.3*	10								
	D 6	18.3	96(+2)									

Désignation : Cukorszőlő

Emplacement : 1-20 56 A. 2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -
cotonneux ⑨.
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé ② - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦^{3^e} - en gouttière ⑧ - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses ⑧ - cotonneuses ⑨.
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé ③^{1^{er}} - cuivrées 4 - jaunes ⑤^{3^e} -
à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 -
vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^o et de la 3^o feuille
détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation : *Cukhorzolo*
Emplacement : *1.20 S 6 A.2*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Emplacement :

Cukorszőlő
1. 20 56 4.5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

N° ordre

Désignation

VASSAL

Planche

côté n°

sousche 1 2 3 4

5

Calvo Cukorazölö

1-20 56

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioilaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioilaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

-- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 72

Emplacement :

Cukorszölő

Désignation :

1. 20 564-4

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁴ (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ^{24x20} (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) ^{un peu charnue} - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile (2).

Calvo 72

DENOMINATION /
EMPLACEMENT /

Cukorszőlő

1-20564-4

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), ^{fig. sur les nœuds} côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranécux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Nœuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne** : 10. cms
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4)
- : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire** : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

N° d'ordre :

ni

Désignation :

Cu horszöti

Origine :

Emplacement :

cl 1 pl 20 86

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. ♀
- 9 - L₁/L ① - ② - 3.
- 10 - L₂/L ① - ②.
- 11 - Lobes 1 - ③ - 5 - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ① - 1 - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme 1 - 2 - ③.
- 17 - Dents : Méd/B 1 - ② - 3.
- 18 - Angle lob. term. 1 - ② - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. au dég.) ① - 2 - ③.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨.
- 21 - Angle L₃ ~~KL~~ L'₃ ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - ② - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - 3.
- Forme : 4 - ⑤.
- Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Domergue 80